

ИНСТРУКЦИЯ по применению средств ФЕРМЕНКОЛ® косметической линии EnTher® для ухода за кожей

ОПИСАНИЕ:

Средства **Ферменкол® косметической линии EnTher®** рекомендуется использовать для ухода за проблемной рубцово-измененной кожей лица и тела с целью улучшения ее внешнего вида.

Ферменкол® — ферментное средство, представляющее собой комплекс коллагенолитических протеаз из гидробионтов с молекулярными массами 36 кДа, 35 (I) кДа, 35 (II) кДа, 32 кДа, 28 кДа, 25 (I) кДа, 25 (II) кДа, 25 (III) кДа и 23 кДа. Патент на изобретение: РФ №2141310.

ДЕЙСТВИЕ:

Комплекс коллагенолитических протеаз из гидробионтов обладает высокой коллагенолитической активностью, обеспечивая гидролиз пептидных связей коллагена. Проявляет избирательную активность к молекулам измененного коллагена и наименее активен в отношении фибрилл нативного коллагена, присущего здоровой коже. Коррекция и улучшение внешнего вида рубцово-измененной кожи происходит вследствие гидролиза избыточного коллагена. Помимо коллагенолитической активности комплекс коллагенолитических протеаз из гидробионтов обладает общей протеолитической активностью и способностью гидролизовать полисахариды, благодаря чему происходит комплексное воздействие на проблемную рубцово-измененную кожу.

Средства **Ферменкол® косметической линии EnTher®** способствуют:

- улучшению внешнего вида проблемных рубцово-измененных участков кожи
- увеличению эластичности, смягчению, увлажнению рубцово-измененных участков кожи
- восстановлению нормальной окраски рубцово-измененных участков кожи

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Не рекомендуется использовать при индивидуальной непереносимости компонентов средств **Ферменкол® косметической линии EnTher®**. При гиперчувствительной коже применять после проведения аппликационных кожных проб с нанесением раствора или геля на 24-48 часов. При попадании сухого средства, его растворов, а также геля в глаза необходимо промыть их водой. Беречь от детей.

Применять не ранее 2-3 недель после эпителизации поврежденной кожи.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

АО НПК «Высокие Технологии», 191167, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Смольнинское, ул. Александра Невского, д. 9, лит. 3, пом.1Н-03

ФЕРМЕНКОЛ® ГЕЛЬ косметической линии EnTher®

ОПИСАНИЕ:

Ферменкол® гель, 10 г или 30 г — прозрачная масса в алюминиевой тубе.

Состав: вода, глицерин, аммоний акрилоилдиметилтаурат, винилпирролидон сополимер, феноксиэтанол, этилгексилглицерин, аммония сульфат, комплекс коллагенолитических протеаз.

Патенты на изобретение: РФ №2462265; US 9,468,682 B2.

СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

Аппликационно

Нанести гель тонким слоем легкими движениями на чистую сухую кожу.

Периодичность: 2-3 раза в день. Длительность курса: 30-40 дней.

Рекомендуется для коррекции формирующихся рубцово-измененных участков кожи.

Фонофорез

Для повышения эффективности воздействия геля Ферменкол возможно использовать фонофорез.

Перед процедурой нанести гель в достаточном количестве на чистую сухую кожу. Режим введения: интенсивность излучения при применении в области туловища и конечностей – 0,3 Вт/см², в области лица и шеи – 0,2 Вт/см². Продолжительность процедуры на одну область: 3-5 минут. Общая продолжительность процедуры на нескольких областях не должна превышать 20 минут.


Периодичность процедур: ежедневно, допустимый интервал между процедурами не более 2-х дней. Длительность курса: 10-15 процедур.

Интервал между курсами: не менее 14 дней.

Рекомендуется для коррекции сформировавшихся рубцово-измененных участков кожи.



1 Ознакомиться с инструкцией



2 Очистить участок кожи



3 Открыть тубу с гелем



4 Нанести гель на сухую кожу



5 Провести процедуру фонофореза

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Хранить при температуре от 0°C до 25°C. После вскрытия хранить при температуре от 2°C до 6°C не более 2-х месяцев.

СРОК ГОДНОСТИ:

3 года с даты изготовления. Не использовать по истечении срока годности.

ФЕРМЕНКОЛ® НАБОР ДЛЯ ЭНЗИМНОЙ КОРРЕКЦИИ
косметической линии EnTher®

ОПИСАНИЕ:

Ферменкол® средство косметическое ферментное, 4 мг — лиофилизированный порошок от светло-желтого до светло-коричневого цвета в стеклянном флаконе.

Состав: комплекс коллагенолитических протеаз из гидробионтов.

Солактин® средство для приготовления раствора ферментов, 40 мл — прозрачная жидкость в полимерном флаконе.

Состав: вода, феноксиэтанол, этилгексилглицерин, кислота лимонная, калия гидроксид, кальция хлорид, аммония сульфат.

Патенты на изобретение: РФ №2462265; US 9,468,682 B2.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Электрофорез

Исходя из специфических факторов, вызвавших появление проблемных рубцово-измененных участков кожи, применяют растворы **Ферменкол®** различной концентрации.

Рекомендуемая концентрация составляет 0,01-0,02%, увеличение концентрации раствора ферментов до 0,05-0,1% возможно после консультации со специалистом.

Концентрация раствора Ферменкол	Количество средства Солактин на 1 флакон Ферменкол
0,01%	40 мл
0,02%	20 мл
0,05%	8 мл
0,1%	4 мл

Для проведения процедуры на 1 см² рубцово-измененной кожи требуется 0,1-0,2 мл раствора **Ферменкол®**.

Раствором **Ферменкол®** смочить прослойку из фильтровальной бумаги или марлевую салфетку, наложить на чистую сухую кожу.

Провести процедуру электрофореза.

Введение раствора Ферменкол® осуществлять с положительного полюса (с анода)!


Режим введения: плотность тока не более 0,1 мА/см² при применении в области туловища и конечностей, и не более 0,05 мА/см²

в области лица и шеи. Продолжительность процедуры: 10-25 минут. Периодичность процедур: ежедневно, допустимый интервал между процедурами не более 2-х дней. Длительность курса: 10-15 процедур. Интервал между курсами: не менее 14 дней.

Рекомендуется для коррекции формирующихся и сформировавшихся рубцово-измененных участков кожи.




1
Ознакомиться
с инструкцией



2
Вскрыть
флаконы



3
Влить небольшое
количество Солактина
во флакон
с Ферменколом



4
Влить содержимое
флакона в мерный
стакан



5
Добавить необходимое
количество Солактина,
руководствуясь
таблицей



6
Смочить салфетку
приготовленным
раствором.
Провести процедуру
электрофореза

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Хранить при температуре от 4°C до 25°C.

Срок хранения приготовленного раствора **Ферменкол®** составляет 10 суток при температуре от 2°C до 6°C.

Нагрев готового раствора выше 40°C может привести к снижению активности средства.

СРОК ГОДНОСТИ:

3 года с даты изготовления. Не использовать по истечении срока годности.