

### Пошаговая инструкция по применению геля Ферменкол с мезороллером:

1. Очистить кожу в зоне воздействия при помощи антисептического средства.
2. Обработать мезороллер раствором антисептика (хлоргексидин, мирамистин), дождаться полного высыхания.
3. Нанести на кожу в зоне рубцов/целлюлита гель Ферменкол.
4. После нанесения геля аккуратно обработать кожу мезороллером в течение 1-2 минут. Давление на кожу мезороллером НЕ должно быть сильным. Движения мезороллера должны быть медленными и прямыми: вертикальными и горизонтальными. Запрещены волнообразные и круговые движения.
5. По окончании процедуры удалить ватным диском кровяную росу с кожи и снова нанести гель Ферменкол тонким слоем. Дать гелю впитаться.
6. Промыть мезороллер под струей воды и обработать антисептиком.
7. Убрать мезороллер в защитный чехол и хранить его в чехле до следующей процедуры, не допуская соприкосновения с другими поверхностями.
8. Проводить процедуру раз в 3 дня.

**Необходимо пройти 10 процедур с гелем Ферменкол. Очень важно делать интервалы между процедурами** не менее 2 дней, чтобы кожа успела восстановиться. Количество курсов подбирается индивидуально, основываясь на возрасте рубцов/выраженности целлюлита, их локализации и динамики у пациента после терапии с Ферменкол.

**Интервал между курсами составляет 30 дней**, в это время необходимо наносить гель тонким слоем на чистую сухую кожу 2 раза в день. Это необходимо для поддержания эффекта от применения с мезороллером.

**Противопоказания к применению мезороллера:** нарушения свертываемости крови, заболевания крови, злокачественные новообразования, невусы, бородавки, папилломы в зоне воздействия, острые инфекционные заболевания, беременность, активный туберкулез, тромбоз, тромбоз в зоне воздействия, острые гнойные воспалительные процессы, кожные заболевания в зоне воздействия (экзема, нейродермит, псориаз, акне, розацеа), системные заболевания соединительной ткани, рассеянный склероз, **свежие гипертрофические рубцы в стадии роста (до года), келоидные рубцы и склонность к их образованию**, невралгия тройничного нерва в стадии обострения.

### Рекомендации от специалистов:

- прокатывать валик по массажным линиям, без нажима, медленно и осторожно;
- нельзя поворачивать валик, не отрывая его от эпидермиса;
- продолжительность манипуляции не должна превышать 20 минут в день. Для тонкого эпидермиса с куперозом/варикозом — 10 минут. Курс 10-20 процедур в зависимости от степени поражения кожи;
- после курса необходим перерыв на 30 дней, то есть можно обрабатывать другую зону. Например, после манипуляций на животе, можно перейти к бедрам;
- после процедуры нанесите на кожу Ферменкол гель, чтобы усилить всасывание активных веществ;
- на следующий день после процедуры примените солнцезащитный крем во избежание пигментации.



