

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по применению противорубцовых средств
ФЕРМЕНКОЛ®



НОВИНКА

ГЕЛЬ СИЛИКОНОВЫЙ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ОБРАЗОВАНИЯ
ГИПЕРТРОФИЧЕСКИХ И КЕЛОИДНЫХ РУБЦОВ




ОСТАНАВЛИВАЕТ
АКТИВНЫЙ РОСТ
РУБЦОВ

ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
ПАТОЛОГИЧЕСКОЕ
РУБЦЕВАНИЕ

ЛИКВИДИРУЕТ
ОКСИДАТИВНЫЙ СТРЕСС
В РУБЦЕ

НОРМАЛИЗУЕТ СИНТЕЗ
СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
ВНЕКЛЕТОЧНОГО МАТРИКСА



ОГЛАВЛЕНИЕ

Что такое Ферменкол	4
Механизм действия	5
Формы выпуска	6
Экспертное мнение	8
Профилактика образования рубцов	9
Коррекция гипертрофических и келоидных рубцов	9
Коррекция рубцов постакне	11
Коррекция стрий и атрофических рубцов	12
Коррекция нежелательных явлений в косметологии и пластической хирургии	14
Коррекция фиброзного целлюлита	15
Методики применения:	
1) Аппликационное применение	16
2) Электрофорез с набором Ферменкол для энзимной коррекции	17
3) Микротоковая терапия с гелем Ферменкол	18
4) Фонофорез с гелем Ферменкол	19
5) Микронидлинг с набором Ферменкол для энзимной коррекции	21
Инструкция по приготовлению раствора Ферменкол	22

ЧТО ТАКОЕ ФЕРМЕНКОЛ

Ферменкол® — серия средств для направленного ухода за рубцово-измененной кожей после операций, ожогов, травм, акне, пирсинга, удаления новообразований кожи. Применяется для коррекции и профилактики атрофических, гипертрофических и келоидных рубцов, а также в комплексной терапии фиброзных осложнений после косметологических процедур.

Действующее начало средств Ферменкол — мощный комплекс из 9 ферментов коллагеназы, который разрушает патологическую рубцовую ткань и возвращает коже здоровый вид.

ЭФФЕКТ ОТ ПРИМЕНЕНИЯ:

- уменьшается объем рубцовой ткани;
- повышается эластичность рубца;
- останавливается активный рост рубца;
- выравнивается рельеф кожи;
- исчезают зуд и болевые ощущения;
- нормализуется окраска кожи;
- предотвращается образование грубого рубца;
- при атрофии поднимается «дно» рубцовой ткани;

В средствах Ферменкол с коллагеназой использована трансдермальная формула Nanotrop SA*, которая обратимо увеличивает проницаемость рогового слоя, эпидермиса и дермы. Ферменты коллагеназы проникают на всю глубину рубцовой ткани, разрушают патологический коллаген, расчищают внеклеточный матрикс и активируют фибробласты, что способствует формированию здорового каркаса дермы.

Ферменкол применяют в комплексной терапии лечения рубцов:

- с инъекциями глюкокортикостероидов, гиалуронидазы, нативного коллагена;
- с силиконосодержащими средствами, компрессионным бельем;
- с процедурами лазерной шлифовки, радиочастотной абляции, фотофорезом (НИЛИ);
- с импульсным лазером на красителях с длиной волны 590 нм;
- с физиопроцедурами: электрофорезом, фонофорезом и микротоковой терапией;
- с микронидлингом, субцизией и букки-терапией.



Nanotrop SA — участник биомедицинского кластера «Сколково»

*Патенты: RU 2462265 / US 9,468,682 B2

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ

Ферменкол комплексно воздействует на основные компоненты рубцовой ткани и может использоваться в виде монотерапии¹, обладая коллагенолитической, гиалуронидазной и общей протеолитической активностью. Ферменкол разрушает патологический коллаген и избыточную гиалуроновую кислоту до молекул аминокислот и олигосахаридов и использует их в качестве строительного материала для восстановления здорового каркаса кожи.

ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ

комплекс из 9 ферментов коллагеназы избирательно воздействует на патологическую рубцовую ткань, практически не затрагивая интактные ткани



Результаты исследований ферментативной активности:

По способности разрушать избыточный коллаген **Ферменкол превосходит в несколько раз** все известные препараты коллагеназы.²

По способности разрушать гиалуроновую кислоту **Ферменкол превосходит в 4 раза** препараты гиалуронидазы.³

Применение электрофореза с Ферменколом эффективнее, чем электрофорез с Лидазой и фонофорез с Контрактубексом.⁴

1. Парамонов Б.А., Турковский И.И., Антонов С.Ф. Ферментная терапия патологических рубцов кожи. — Искусство профес- сии/налов красоты No2/201.

2. Бондарев С.В. Применение препаратов коллагеназы для лечения ран и рубцов кожи. — Санкт-Петербург, ВМедА, 2008.

3. Турковский И.И., Парамонов Б.А., Антонов С.Ф. Сравнительная оценка глубины гидролиза коллагена и гиалуроновой кислоты в системе in vitro препаратами коллагеназы и гиалуронидазы. БЭБИМ No 7. — Москва, РАМН, 2008.

4. Отчет Военно-медицинской академии о научно-исследовательской работе. — Санкт-Петербург, ВМедА, 2008.

ФОРМЫ ВЫПУСКА

Ферменкол PRO — силиконосодержащий гель нового поколения для профилактики образования рубцов в ранний реабилитационный период после операций и травм.

Ферменкол PRO применяют аппликационно на свежих рубцах до трех месяцев, гель наносят тонким слоем на чистую сухую кожу.

В составе — умный комплекс силиконов и мощный антиоксидант глутатион-нано, который ускоряет регенерацию тканей и борется с оксидативным стрессом в рубце.

Силиконовый гель Ферменкол PRO рекомендуется назначать на ранних этапах созревания рубца сразу после эпителизации раны для его нормального формирования.

При своевременном и обоснованном назначении силиконового геля Ферменкол PRO достигается видимый эстетический результат, удовлетворяющий и врача, и пациента.



Ферменкол гель 0,01 % — прогрессивное ферментное средство для коррекции гипертрофических и келоидных рубцов с доказанной эффективностью.

Ферменкол гель применяют аппликационно для коррекции свежих выпуклых рубцов, методом фонофореза, электрофореза, фотофореза и микротоковой терапии для коррекции гипертрофических зрелых рубцов, а также для устранения атрофических рубцов в составе комплексной терапии.

Сочетанное применение силиконового геля Ферменкол PRO и геля Ферменкол с коллагеназой на растущих гипертрофических рубцах оказывает синергический эффект: устраняет уже сформировавшийся избыточный коллаген и препятствует образованию нового.

Ферменкол набор для энзимной коррекции

применяют с процедурой электрофореза для коррекции гипертофических и келоидных рубцов после операций, ожогов, удаления новообразований кожи, а также для коррекции атрофических рубцов с процедурой микронидлинга.

В набор Ферменкол для энзимной коррекции входят:

Ферменкол, 4 мг — комплекс коллагенолитических протеаз, стерильный лиофилизированный порошок.

Солактин, 40 мл — средство для приготовления раствора ферментов, повышает эффективность транспорта коллагеназы в рубцовую ткань.



Ферменкол Элактин — революционное средство с трансдермальной доставкой для коррекции атрофических рубцов (стрии, постакне, рубцы после ветряной оспы, травмы, пирсинга).

Ферменкол Элактин применяют аппликационно, методом фонофореза, фотофореза (НИЛИ) и с микротоковой терапией.

Ферменкол Элактин разрешен к применению при наличии высыпаний во время прохождения курса лечения рубцов постакне с ретиноидами. Ферменты коллагеназы за счет коллагенолитической

и общей протеолитической активности способствуют быстрой санации фиброзной капсулы, устраняя воспалительные элементы и успешно сочетаясь с другими препаратами, направленными на борьбу с акне.

В набор Ферменкол Элактин входят 2 геля по 15 г:

Гель Ферменкол S 0,05 %. Ферменты коллагеназы расщепляют тройную спираль патологического коллагена в рубцовой ткани до отдельных аминокислот.

Гель Элактин. Низкомолекулярная гиалуроновая кислота с сигнальными пептидами Матриксил® стимулирует синтез нативного коллагена и эластина, восстанавливая здоровый каркас кожи.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Кожина Кристина — к.м.н., врач косметолог, дерматовенеролог клиники «Новита».



Ферменкол — это препарат, который я всегда назначаю пациентам, столкнувшимся с проблемой атрофических рубцов постакне. Коррекция этого состояния — задача не из простых, но грамотный и осознанный алгоритм терапии всегда позволяет добиться прекрасного результата. Благодаря ферментам коллагеназы происходит избирательное разрушение коллагена с измененной структурой. Именно этот эффект препарата Ферменкол позволяет ему занимать одно из ключевых мест в комплексной терапии атрофических рубцов.

Ромашкина Анастасия Сергеевна — к.м.н., врач-косметолог, дерматовенеролог, дерматоонколог, физиотерапевт, главный врач клиники Chistotel.

Как врач-дерматолог, косметолог, в своей практике я ежедневно сталкиваюсь с различными рубцами: постакне, послеоперационными, посттравматическими и рубцами после удаления новообразований. Ферменкол гель является неотъемлемой частью моей работы с рубцами и позволяет получить предсказуемый контролируемый результат.



Соколова Елена Викторовна — врач косметолог, дерматовенеролог, физиотерапевт. Основатель школы клинической анатомии и косметологии «AnaBioS». Главный врач клиники с учебным центром «Грани красоты».



Революционность Ферменкол Элактин заключается в том, что теперь мы можем неинвазивно деструктурировать поврежденные волокна коллагена и безинъекционно стимулировать синтез биополимеров каркаса дермы. Это гарантирует отсутствие микротравм, побочных эффектов (гематомы, рубцы, пигментные пятна) и предсказуемый отличный результат.

Меньщикова Галина Владимировна — к.м.н., врач дерматолог, дерматоонколог, клинический опыт работы более 20 лет, частная практика.

Ферменкол назначаю пациентам для коррекции рубцов после удаления новообразований кожи, последние 2 года успешно применяю на рубцы постакне. Эффект в виде осветления гиперпигментации и выравнивания рельефа кожи достигается почти у каждого пациента. Гель удобен в применении и дает видимый результат в кратчайшие сроки.



ПРОФИЛАКТИКА ОБРАЗОВАНИЯ РУБЦОВ

Ферменкол PRO — гель на основе силикона для уменьшения выраженности и профилактики образования гипертрофических рубцов. Ферменкол PRO создает защитную пленку, сохраняя оптимальный гидробаланс кожи и нормализуя синтез структурных элементов внеклеточного матрикса.

КАК РАБОТАЕТ ФЕРМЕНКОЛ PRO?

- протезирует верхний слой эпидермиса в зоне рубца
- препятствует трансэпидермальной потере воды с поверхности кожи
- останавливает активный рост свежих рубцов до 3 месяцев
- предупреждает образование патологических рубцов
- снижает оксидативный стресс в рубцово-пораженных участках кожи
- обеспечивает внутриклеточную детоксикацию поврежденной кожи
- нормализует синтез структурных элементов внеклеточного матрикса

КОРРЕКЦИЯ ГИПЕРТРОФИЧЕСКИХ И КЕЛОИДНЫХ РУБЦОВ

Ферменкол с коллагеназой (Ферменкол гель, Ферменкол набор для энзимной коррекции) подвергает глубокому гидролизу основные компоненты рубцовой ткани — избыточный коллаген и гиалуроновую кислоту¹, тем самым выравнивая рельеф и цвет кожи. Лечение патологических рубцов с использованием физиопроцедур с Ферменкол имеет терапевтическую эффективность.²

Электрофорез и ультрафонофорез с Ферменкол — эффективные методы введения комплекса коллагенолитических протеаз в рубцовую ткань.³ Под воздействием электрического тока и ультразвука повышается диффузия ферментов коллагеназы в глубоко расположенные участки рубцовой ткани и ускоряется редукция патологического коллагена.⁴

Благодаря физиопроцедурам с Ферменкол противорубцовый эффект достигается в разы быстрее, чем при накожных аппликациях: рубцы бледнеют, уменьшаются в размерах, становятся менее плотными и более эластичными, снижается или прекращается зуд, нормализуется гидратация рубцовой ткани. Успешный опыт применения электрофореза и фонофореза с Ферменкол для коррекции гипертрофических и келоидных рубцов позволяет говорить о высокой эффективности данного средства.^{5, 6*}

**Количество курсов и методы применения смотрите в разделе «Методики применения»*

1. Климова О.А., Чеботарев В.Ю. Коллагенолитический комплекс протеаз из гепатопанкреаса камчатского краба: энзимологические свойства индивидуальных компонентов. — БЭБиМ № 10. — Москва, РАМН, 1999.

2. Отчет Военно-медицинской академии о научно-исследовательской работе. — Санкт-Петербург, ВМедА, 2008.

3. Коррекция рубцов в условиях физиотерапевтического кабинета//Медтехника и медизделия. — 2012, №2(73) — 59 с.

4. Пономаренко ГН, Карпова Т.Н. Физические методы лечения рубцов. — СПб, 2009. — 112 с.

5. Электрофорез препарата ферменкол для коррекции рубцов в дерматологии и хирургии: Методические рекомендации. — СПб: ГБОУ ВПО СЗГМУ им. И.И. Мечникова. — 2012. — 20 с.

6. Современные методы лечения детей с послеожоговыми рубцами: учебно-методическое пособие — М.: ГБОУ ДПО Р.



После 3 курсов микротоковой
терапии с гелем Ферменкол



После 2 курсов аппликаций
с гелем Ферменкол



После 3 курсов микротоковой
терапии с гелем Ферменкол



После 1 курса электрофореза
с набором Ферменкол



После 2 курсов электрофореза
с набором Ферменкол



После 2 курсов аппликаций
с гелем Ферменкол

КОРРЕКЦИЯ РУБЦОВ ПОСТАКНЕ

При коррекции рубцов постакне основным субстратом для воздействия комплекса коллагеназ являются патологические коллагеновые волокна.

В результате применения Ферменкол наблюдается полное или частичное регрессирование рубцов, происходит уменьшение их глубины, стирается разница в цвете между рубцовой и окружающими тканями, обесцвечивается интенсивная ярко-фиолетовая окраска, поднимается дно рубцов.¹



После 1 курса фонофореза
с набором Ферменкол Элактин



После 1 курса электрофореза
с набором Ферменкол Элактин



После 1 курса аппликаций
с набором Ферменкол Элактин



После 3 курсов аппликаций
с гелем Ферменкол

1. Шиманская И.Г. Методы коррекции рубцовых изменений кожи у пациентов на фоне угревой болезни. — Минск, Медицинские новости №9, 2015.

Применение неинвазивных методик введения в рубцовую ткань коллагеназ патогенетически обосновано.¹

Для устранения рубцов постакне в кабинете косметолога применяют **электрофорез, ультрафонофорез, фотофорез (НИЛИ), а также микротоковую, радиочастотную терапию, магнитотерапию и микронидлинг с Ферменкол**, что позволяет получить значительный клинический результат за более короткий период времени.

После лазерной деструкции сосудов, лазерной шлифовки рубцов и посттравматической пигментации в домашний уход назначают аппликации с набором Ферменкол Элактин. Курс аппликаций составляет 6-8 недель, гели нужно наносить поочередно утром и вечером тонким слоем на чистую сухую кожу.*

**Количество курсов и методы применения смотрите в разделе «Методики применения»*

КОРРЕКЦИЯ СТРИЙ И АТРОФИЧЕСКИХ РУБЦОВ

Ферменкол Элактин позволяет неинвазивно деструктуризировать поврежденные волокна коллагена и безинъекционно стимулировать синтез биополимеров каркаса дермы, гарантируя отсутствие микротравм и побочных эффектов в виде воспалений, гематом, рубцов, посттравматических пигментных пятен.²

Для устранения стрий и атрофических рубцов используют **электрофорез, ультрафонофорез, фотофорез (НИЛИ), микротоковую, радиочастотную терапию, микроигльчатый RF, магнитотерапию и микронидлинг с Ферменкол**. Благодаря данным методам повышается проницаемость мембран и чувствительность клеток к активным компонентам Ферменкол, ускоряются процессы ремодуляции структуры атрофических рубцов, быстрее восстанавливается каркас дермы.

После лазерной деструкции сосудов, лазерной шлифовки, субцизии и микроигльчатого RF в домашний уход назначают аппликации с набором Ферменкол Элактин. Курс составляет 8 недель, гели нужно наносить утром и вечером тонким слоем на чистую сухую кожу.*

После процедуры RF-лифтинга на аппаратах Morpheus и Vivase рекомендовано «закрыть» обработанные участки кожи раствором Ферменкол. Для его приготовления потребуется комплекс коллагенолитических протеаз из набора «Ферменкол для энзимной коррекции» и вода для инъекций (см. стр. 21). Сочетанное применение аппаратных методик и средств Ферменкол дает более быстрый и выраженный результат как на свежих, так и на застарелых атрофических рубцах.

**Количество курсов и методы применения смотрите в разделе «Методики применения»*

1. Коррекция рубцов в условиях физиотерапевтического кабинета//Медтехника и медизделия. — 2012, No2(73) — 59 с.

2. Соколова Е.В., врач косметолог, дерматовенеролог, физиотерапевт. Основатель школы клинической анатомии и косметологии «АнаBioS». Главный врач клиники с учебным центром «Грани красоты». Соавтор учебника «Руководство по дерматокосметологии», 2008 г.



После 2 курсов аппликаций
с набором Ферменкол Элактин



После 1 курса аппликаций
с набором Ферменкол Элактин



Через 2 недели аппликаций
с набором Ферменкол Элактин



После 2 курсов аппликаций
с набором Ферменкол Элактин



После 1 курса аппликаций
с набором Ферменкол Элактин



После 1 курса аппликаций
с набором Ферменкол Элактин



КОРРЕКЦИЯ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ ЯВЛЕНИЙ В КОСМЕТОЛОГИИ И ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ

Фиброз в месте введения филлеров гиалуроновой, полимолочной кислоты (PLA), полиметилметакрилата (PMMA), полиакриламидного геля (РААГ), полиалкилимидного геля (РАIG), силикона, коллагеностимуляторов и мезонитей является естественной реакцией организма. У ряда пациентов разрастание соединительной ткани носит избыточный характер и требует коррекции.

Неинвазивное введение геля Ферменкол посредством микроотоковой терапии и фонофореза обеспечивает мощный гидролиз патологических волокон коллагена. Таким образом, уменьшается объем фиброзной ткани, выравнивается рельеф кожи, повышается гидратация, восстанавливается симметрия. Эффект заметен уже после нескольких процедур.*

**Количество курсов и методы применения смотрите в разделе «Методики применения»*



*Гиперкоррекция филлером
гиалуроновой кислоты
5 процедур микроотоковой терапии
с гелем Ферменкол*



*Осложнение после введения
полимолочной кислоты
Курс с гелями Ферменкол S и Элактин
после инъекций дексаметазона
и лазеродеструкции сосудов*



*Осложнение после пластической операции
RF-терапия и фотофорез с гелями Ферменкол S и Элактин
результаты работы Соколовой Елены Викторовны*



Гипертрофический рубец после маммопластики

Фотодинамическая терапия на аппарате Revixan 1 раз в неделю, Ферменкол гель 2 раза в день



Келоидный рубец

Дипроспан 1 раз в 4 недели. Ферменкол гель 2 раза в день: наружно ежедневно

результаты работы Ромашкиной Анастасии Сергеевны

КОРРЕКЦИЯ ФИБРОЗНОГО ЦЕЛЛЮЛИТА

Фонофорез с гелем Ферменкол и микронидлинг с набором Ферменкол для энзимной коррекции — эффективные методы борьбы с фиброзным целлюлитом. Данные методы позволяют коллагенолитическим ферментам проникнуть в соединительную ткань и расчистить внеклеточный матрикс от деформированных волокон патологического коллагена. Ферменкол обеспечивает мощный гидролиз измененного коллагена, в результате чего эффективно разрыхляются фиброзные микроузлы и макро модули, значительно выравнивается рельеф и повышается тургор кожи*.



*Фиброзный целлюлит
4 процедуры микронидлинга
с раствором Ферменкол
с интервалом 2 недели*

*результат работы Масгутова Руслана
Фаридовича*

**Количество курсов и методы применения смотрите в разделе «Методики применения»*

МЕТОДИКИ ПРИМЕНЕНИЯ

1) Аппликационное применение

Данный метод применения подразумевает нанесение гелей тонким слоем на чистую сухую кожу в зоне рубцов или стрий. Актуально для свежих рубцовых деформаций, а также в перерывах между курсами физиопроцедур для достижения наилучшего результата.



• Силиконовый гель Ферменкол PRO

Курс применения на свежие рубцы (до 3 месяцев): 30 дней.

Количество курсов: 2-3.

Перерыв между курсами: непрерывно до 90 дней. Начинать использовать Ферменкол PRO необходимо сразу после эпителизации раны и снятия швов — до момента формирования нормотрофического рубца. Наносить гель необходимо тонким слоем на чистую сухую кожу 2 раза в день. Высыхание геля занимает 1-3 минуты, но в зависимости от типа кожи время может увеличиваться. Использовать гель на открытую рану не рекомендовано.

Ферменкол PRO назначают после операций и травм для профилактики образования рубцов и с целью улучшения их эстетического вида.

• Гель Ферменкол 10 г, 30 г

Курс применения на свежие рубцы (от 3 до 8 месяцев): 30 дней.

Количество курсов: 2-3.

Перерыв между курсами: 7-10 дней.

Применять до момента наступления желаемого результата. Начинать коррекцию рубцов с гелем Ферменкол стоит при первых признаках при первых признаках избыточного рубцевания.

При блефаропластике применять Ферменкол гель следует после окончательного формирования рубца, так как кожа в области век тонкая, а коллагеназа, входящая в состав Ферменкол, имеет высокую активность. Преждевременно начатый курс аппликаций с гелем Ферменкол может привести к образованию атрофического рубца.



• Ферменкол Элактин



Курс применения на свежие атрофические рубцы и стрии (до 6 месяцев): 6-8 недель.

Количество курсов: 2-3.

Интервал между курсами: 7-10 дней.

Применять до момента наступления желаемого результата. Начинать коррекцию с Ферменкол Элактин следует при первых признаках формирования атрофических рубцов и стрий.

Ферменкол действует избирательно на рубцовую ткань, не затрагивая здоровую кожу и не всасываясь

в общий кровоток. Средства Ферменкол можно использовать во время беременности, лактации, а также детям с 0 лет.

Для достижения более быстрого и выраженного результата рекомендуется применять средства Ферменкол с процедурами электрофореза, фонофореза, микронидлинга либо микротоковой терапии. Количество курсов и метод применения зависят от степени выраженности рубцовых деформаций кожи.

2) Электрофорез с набором Ферменкол

Электрофорез с набором Ферменкол — наиболее эффективный метод введения ферментов коллагеназы в глубоко расположенные участки рубцовой ткани. Активные вещества депонируются в коже и подкожно-жировой клетчатке, существенно увеличивая время воздействия препарата.



Проведение процедуры электрофореза с набором Ферменкол для энзимной коррекции

Режим введения: плотность тока не более 0,05 мА/см² в области лица и шеи.

Продолжительность процедуры: 20-25 минут.

Периодичность процедур: ежедневно, допустимый интервал между процедурами не более 2-х дней.

Интервал между курсами: 7-10 дней.

1. Приготовить раствор ферментов необходимой концентрации, руководствуясь инструкцией по применению Ферменкол.
2. Перед процедурой очистить кожу.
3. Смочить марлевую салфетку приготовленным раствором Ферменкол. Расход готового раствора составляет 0,1-0,2 мл на 1 см² рубца.
4. Провести процедуру электрофореза. Введение раствора ферментов осуществлять с положительного полюса.

Вид и возраст рубца/степень выраженности		Концентрация раствора Ферменкол	Кол-во процедур	Кол-во курсов
Гипертрофический	Свежий (до 6 мес.)	0,01%	10	1-2
	Зрелый	0,02%	10	2-3
Келоидный	Свежий (до 6 мес.)	0,05%	10-15	3-4
	Зрелый	0,05-0,1%	10-15	5-6
Постакне по гипертрофическому типу	Легкая	0,01%	5-7	1
	Средняя	0,02%	10-12	2
	Тяжелая	0,02%	12-15	3
Фиброзные осложнения после введения филлеров, полимолочной кислоты, коллагеностимуляторов и мезонитей	-	0,02%	5-10	1-2

3) Микротоковая терапия с гелем Ферменкол

Микротоковая терапия с гелем Ферменкол нормализует электрический баланс тканей, способствует быстрому проникновению ферментов коллагеназы в глубь дермы, реконструируют межклеточный матрикс, стимулируют синтез нативного коллагена и эластина, уменьшают отечность и улучшают трофику тканей, дают выраженный противорубцовый эффект.

Проведение процедуры микротоковой терапии с гелем Ферменкол

1. Перед процедурой очистить кожу. Снять все металлические предметы.
2. Подключить к аппарату токопроводящие перчатки или подвижные электроды (пробы). Выбрать на аппарате программу воздействие однонаправленным импульсным током.
3. Нанести гель Ферменкол: на все лицо при использовании перчаток, на локальные рубцы при использовании подвижных электродов (проб). Провести процедуру микротоковой терапии 45-60 минут. Добавлять гель Ферменкол по мере необходимости, не допуская высыхания.
4. Смыть остатки геля. Нанести уходовое средство.

Показания	Рабочие электроды	Длительность курса
Комплексная реабилитация после пластических операций	Токопроводящие перчатки	10-14 процедур с периодичностью 2-3 раза в неделю, но не ранее 2-3 недель после операции
Дряблость кожи, постакне	Подвижные электроды (пробы), токопроводящая маска	5-10 процедур в зависимости от степени тяжести
Локальные рубцы после удаления новообразований кожи, малоинвазивных операций	Подвижные электроды (пробы)	12-15 процедур
Фиброзные осложнения после введения филлеров, полимолочной кислоты, коллагеностимуляторов и мезонитей	Подвижные электроды (пробы) токопроводящая маска	5-10 процедур в зависимости от степени тяжести

4) Фонофорез с гелем Ферменкол

Фонофорез с гелем Ферменкол — эффективный метод введения ферментов коллагеназы на всю глубину атрофических, гипертрофических и келоидных рубцов. В результате воздействия акустического поля происходит глубокий тканевой микромассаж, повышается проницаемость мембран, улучшается крово- и лимфообращение, разрыхляется соединительная ткань, усиливается действие активных компонентов Ферменкол. В сочетании с фонофорезом противорубцовый эффект достигается в разы быстрее, чем при обычных накожных аппликациях.

ВНИМАНИЕ!

Не допускается воздействие фонофореза на область сердца. С осторожностью применять на свежие гипертрофические рубцы до трёх месяцев. Процедуры фонофореза не рекомендованы детям до 3 лет.

Проведение процедуры фонофореза с гелем Ферменкол

Режим введения: интенсивность излучения при применении в области туловища и конечностей – 0,3 Вт/см², в области лица и шеи – 0,2 Вт/см².

Продолжительность процедуры на одну область: 3-5 минут.

Общая продолжительность процедуры на нескольких областях не должна превышать 20 минут.

Периодичность процедур: ежедневно, допустимый интервал между процедурами не более 2-х дней.

Интервал между курсами: 10-14 дней.

В перерывах между курсами фонофореза для усиления эффекта рекомендуются накожные аппликации в домашний уход: на гипертрофические и келоидные рубцы гель Ферменкол, на атрофические рубцы Ферменкол Элактин.

1. Перед процедурой фонофореза следует очистить кожу.

2. Нанести на проблемный участок кожи гель из расчета 0,1 - 0,2 г на 1 см² кожи. Далее провести процедуру фонофореза, плотно прижимая головку излучатель к коже и медленно перемещая ее круговыми движениями. Гель по мере пересыхания необходимо добавлять.

3. Для экономии расхода средства допустимо наносить поверх геля Ферменкол нейтральный звукопроводящий гель.

4. По окончании процедуры отключить аппарат, удалить остатки средства с кожи, очистить спиртовой салфеткой головку излучатель.

Вид рубца	Возраст рубца/степень выраженности	Кол-во курсов фонофореза
Гипертрофический	Свежий (до 6 месяцев)	Не рекомендуется
	Зрелый (более 6 месяцев)	2-3 курса по 10 процедур
Келоидный	Свежий (до 6 месяцев)	Не рекомендуется
	Зрелый (более 6 месяцев)	3-4 курса 10-15 процедур
Постакне	Макулярная	1 курс 5-7 процедур
	Легкая	1-2 курса по 10 процедур
	Средняя	2-3 курса по 10-15 процедур
	Тяжелая	3-5 курсов по 10-15 процедур
Фиброзные осложнения после введения филлеров, полимолочной кислоты, коллагеностимуляторов и мезонитей	-	2-3 курса по 10 процедур
Фиброзный целлюлит	-	3-4 курса по 10-15 процедур
Стрии и атрофические рубцы	Свежие (до 6 месяцев)	Не требуется
	Зрелые (более 6 месяцев)	2-3 курса по 10 процедур

5) Микронидлинг с набором Ферменкол для энзимной коррекции

Микронидлинг с набором Ферменкол — метод коррекции рубцовых деформаций с помощью проколов кожи тонкими иглами и введения раствора коллагеназы заданной концентрации. Синергия коллагеназы и микротравматизации кожи расчищает внеклеточный матрикс от дегенеративного коллагена, активизирует фибробласты и запускает синтез структурных элементов каркаса дермы.

В перерывах между курсами микронидлинга для усиления эффекта рекомендуют аппликации в домашний уход: на гипертрофические рубцы гель Ферменкол, на атрофические рубцы Ферменкол Элактин. Применять гели следует после полной эпителизации кожи.

Области применения: постакне, стрии, гипертрофические рубцы, увядающая кожа, фиброзный целлюлит.

Глубина введения: в дерму, учитывая тип и состояние кожи пациента, при фиброзном целлюлите в гиподерму согласно таблице.

Диаметр иглы: 0,2 – 0,4 мм.

Инъекции болезненные, перед процедурой нанести крем с анестетиком на 30-40 мин.

Оценка результата: после первой процедуры следует сделать интервал не менее 7 дней, чтобы оценить динамику. По результатам принять решение о повторной процедуре.

Для приготовления раствора коллагеназы требуется:

1. Комплекс коллагенолитических протеаз, лиофилизированный порошок (Sterile A) в стеклянном флаконе из набора «Ферменкол для энзимной коррекции».
2. Вода для инъекций. Растворитель «Солактин» не использовать, так как он предназначен только для наружного применения с процедурой электрофореза.

Инструкция по приготовлению раствора Ферменкол для микронидлинга

Шаг 1. Приготовление стартового концентрата.

Стартовый концентрат 1 мг/мл

В стеклянный флакон с порошком комплекс коллагенолитических протеаз 4 мг добавить шприцом 4,0 мл воды для инъекций, встряхнуть. Концентрация готового раствора составляет 1 мг/мл.

Возможно однократное замораживание концентрата (стартового раствора). После размораживания стартовый концентрат (1мг/мл) использовать в течение 12 часов.

Комплекс коллагенолитических протеаз	Возраст рубца/степень выраженности
4 мг	4,0 мл

Шаг 2. Приготовление рабочего раствора с заданной концентрацией:

А. Рабочий раствор А с концентрацией 0,05 мг/мл

В шприц 10,0 мл набрать 0,5 мл стартового концентрата (1 мг/мл) и 9,5 мл воды для инъекций, перемешать. Полученная концентрация рабочего раствора А составляет 0,05 мг/мл. Рабочий раствор А (0,05 мг/мл) использовать в течение 12 часов после приготовления.

Количество стартового концентрата (1 мг/мл)	Количество воды для инъекций
0,5 мл	9,5 мл

В. Рабочий раствор В с концентрацией 0,02 мг/мл

В шприц 10,0 мл набрать 4,0 мл рабочего раствора А (0,05 мг/мл) и 6,0 мл воды для инъекций, перемешать. Полученная концентрация рабочего раствора В составляет 0,02 мг/мл. Рабочий раствор В (0,02 мг/мл) использовать в течение 12 часов после приготовления.

Количество рабочего раствора А (0,05 мг/мл)	Количество воды для инъекций
4,0 мл	6,0 мл

С. Рабочий раствор С с концентрацией 0,01 мг/мл

В шприц 10,0 мл набрать 2,0 мл рабочего раствора А (0,05 мг/мл) и 8,0 мл воды для инъекций, перемешать. Полученная концентрация рабочего раствора С составляет 0,01 мг/мл. Рабочий раствор С (0,01 мг/мл) использовать в течение 12 часов после приготовления.

Количество рабочего раствора А (0,05 мг/мл)	Количество воды для инъекций
2,0 мл	8,0 мл

Вид проблемы	Концентрация рабочего раствора коллагеназы	Рабочий раствор	Доза на 1 см2	Глубина введения	Количество и кратность процедур
Постакне по гипертрофическому типу	0,05 мг/мл	A	≤ 0,05 мл	0,5-0,7 мм	1 раз в неделю, при необходимости 6-8 процедур, обязательный мониторинг динамики
Постакне смешанного типа	0,02 мг/мл	B	≤ 0,05 мл	0,5-0,7 мм	1 раз в неделю, при необходимости 6-8 процедур, обязательный мониторинг динамики
Постакне по атрофическому типу	0,02 мг/мл	B	≤ 0,05 мл	0,3-0,5 мм	1 раз в неделю, при необходимости 4-6 процедур, обязательный мониторинг динамики
Стрии свежие до 9 мес.	0,01 мг/мл	C	≤ 0,05 мл	0,1-0,5 мм	1 раз в неделю, при необходимости 4-6 процедур, обязательный мониторинг динамики
Стрии застарелые	0,02 мг/мл	B	≤ 0,05 мл	0,1-0,5 мм	1 раз в неделю, при необходимости 6-8 процедур, обязательный мониторинг динамики
Гипертрофические рубцы молодые до 6 мес.	0,05 мг/мл	A	≤ 0,05 мл	0,5-1,0 мм	1 раз в неделю, при необходимости 6-8 процедур, обязательный мониторинг динамики
Гипертрофические рубцы зрелые	0,05 мг/мл	A	≤ 0,05 мл	0,5-1,0 мм	1 раз в неделю, при необходимости 6-8 процедур, обязательный мониторинг динамики
Омолаживающее воздействие на увядающую кожу лица и шеи	0,01 мг/мл	C	≤ 0,05 мл	0,3-1,0 мм	1 раз в неделю, при необходимости 3-4 процедур, обязательный мониторинг динамики
Фиброзный целлюлит	0,05 мг/мл	A	≤ 0,05 мл	5-10 мм	1 раз в неделю, при необходимости 6-8 процедур, обязательный мониторинг динамики

Официальный дистрибьютор
АО «ФЕРМЕНКОЛ»

Санкт-Петербург,
ул. Маяковского, д. 3Б, лит. А

+7 (812) 945 86 26

+7 931 975 86 26

info@fermencol.ru



ВРАЧАМ СКИДКА 10 %

на всю линейку Ферменкол
при регистрации на сайте fermencol.ru
в разделе «Специалистам»