

Пошаговая инструкция по применению набора Ферменкол Элактин с мезороллером:

1. Очистить кожу от макияжа.
2. Обработать мезороллер раствором антисептика (хлоргексидин, мирамистин), дождаться полного высыхания.
3. Нанести на кожу в зоне рубцов/растяжек гель Ферменкол S.
4. После нанесения геля аккуратно обработать кожу мезороллером в течение 1-2 минут. Давление на кожу мезороллером НЕ должно быть сильным. Движения мезороллера должны быть медленными и прямыми: вертикальными и горизонтальными. Запрещены волнообразные и круговые движения.
5. По окончании процедуры удалить ватным диском кровяную росу с кожи и снова нанести Ферменкол S тонким слоем. Дать гелю впитаться.
6. Промыть мезороллер под струей воды и обработать антисептиком.
7. Убрать мезороллер в защитный чехол и хранить его в чехле до следующей процедуры, не допуская соприкосновения с другими поверхностями.
8. Проводить процедуру раз в 3 дня.

Необходимо пройти 10 процедур с гелем Ферменкол S, а затем 10 процедур с гелем Элактин из набора Ферменкол Элактин. Очень важно делать интервалы между процедурами не менее 2 дней, чтобы кожа восстановилась. Полный курс состоит из 20 процедур и занимает 2 месяца.

Очень важно соблюдать правила септики и антисептики, не забывать обрабатывать мезороллер специальным раствором. Мезороллер предназначен только для индивидуального использования.

Процедура проводится в любое удобное для пациента время суток. Во время прохождения курса в весенне-летний период необходимо использовать солнцезащитный крем с фактором защиты не менее SPF40.

Противопоказания к применению мезороллера: нарушения свертываемости крови, заболевания крови, злокачественные новообразования, невусы, бородавки, папилломы в зоне воздействия, острые инфекционные заболевания, беременность, активный туберкулез, тромбоз в зоне воздействия, острые гнойные воспалительные процессы, **кожные заболевания в зоне воздействия (экзема, нейродермит, псориаз, акне, розацеа)**, системные заболевания соединительной ткани, рассеянный склероз, **гипертрофические и келоидные рубцы и склонность к их образованию**, невралгия тройничного нерва в стадии обострения.

